

**Bij artrodese of amputatie**

Verwekker	Behandeling	Duur behandeling	Opmerking
<b><i>S. aureus</i></b> of flucloxacilline gevoelige coagulase- negatieve stafylokokken	flucloxacilline, 1 g q4h iv	Bij volledige resectie van osteomyelitis: antibiotica postoperatief staken na 48 uur  Indien partiële resectie of arthrodese bedraagt de totale behandelduur tenminste 6 weken – maximaal 12 weken, geteld vanaf laatste positieve cultuur. Het stopmoment wordt mede bepaald door het verloop van de kliniek en de ontstekings- parameters.	Bij twijfel over de volledigheid van de resectie van de infectie: neem peroperatief diepe culturen uit het resterend weefsel en zet de antibiotica door in afwachting van het resultaat.
<b>MRSA</b> of flucloxacilline resistente coagulase- negatieve stafylokokken	vancomycine,  laaddosis 25 mg/kg (max. 2,5 g), toegediend over minstens 1 tot 2 uur (< 15 mg/min). Start na de laaddosis onmiddellijk een continu infuus aan 30 mg/kg/24h (max. 4 g/dag)		
<b>Streptokokken</b>  <b><i>Cutibacterium acnes</i></b>	penicilline, 1 ME q4h iv		
<b>Enterobacterales en overige bacteriën</b>	n overleg met internist- infectioloog of microbioloog.		